



125367, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 80 к.2

+7 (967) 598-02-52
moscow@labpoisk.ru

194363, СПб, пос.Парголово,
ул. Фёдора Абрамова, д. 8

+7 (812) 509-60-28
lab@spbvet.com

192288, СПб,
ул. Бухарестская, д. 122

+7 (812) 509-60-28
lab@spbvet.com

198216, СПб,
пр. Народного Ополчения, д. 19

+7 (812) 509-60-28
lab@spbvet.com

196602, Пушкин,
Павловское ш., д. 101

+7 (812) 509-60-28
lab@spbvet.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик (Клиника)*

Адрес*

Телефон*

Электронная почта*

(Электронная почта Заказчика для получения результатов)

Владелец (ФИО)*

Телефон

ДИАГНОЗ

ФИО врача

⚠ Заполнять только печатными буквами!

* обязательное поле для заполнения

Срок выполнения: до 7 дней.

ИНФОРМАЦИЯ О ЖИВОТНОМ

Обращение* первичное ☐ вторичное ☐

Вид* собака ☐ кошка ☐

Кличка*

Порода*

Дата рождения*

Пол* самец ☐ самка ☐

Кастрирован да ☐ нет ☐

Дата забора материала*

Дата отправки в лабораторию






ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ


⚠ Нумерация исследований соответствует нумерации преискуранта

Важно!

Для интерпретации результатов проточной цитометрии необходима картина морфологии клеток в цитологическом исследовании из той же локализации.

11. ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для исследований
11.1	☐	Иммунофенотипирование лимфоузлов 🔄 (диагностика лимфомы)	 пробирка со средой**	пунктат из ЛУ
11.2	☐	Иммунофенотипирование лимфоузлов 🔄 (диагностика лимфомы)		
11.3	☐	Определение иммунофенотипа лимфоцитов в выпоте 🔄	 выпот в пробирке с ЭДТА, мазки после центри- фугирования	выпот в пробирке с ЭДТА, мазки после центри- фугирования
11.4	☐	Определение иммунофенотипа лимфоцитов в выпоте 🔄		




11.5	☐	Определение иммунофенотипа лимфоцитов при лимфоцитозе 🔄 (диагностика ХЛЛ 🔄)		кровь с ЭДТА, мазок из крови
11.6	☐	Определение иммунофенотипа лимфоцитов при лимфоцитозе 🔄 (диагностика ХЛЛ 🔄)		
11.7	☐	Определение иммунофенотипа циркулирующих в крови клеток 🔄		
11.8	☐	Определение иммунофенотипа циркулирующих в крови клеток 🔄		
11.9	☐	Соотношение CD4+/CD8+ лимфоцитов в крови у 🔄		

****Среда для пунктата из ЛУ:** в пробирку без наполнителя добавить 900 мкл физиологического раствора и 100 мкл сыворотки того же пациента или гомологичного вида животного (с нормальным количеством белка), пунктировать ЛУ как на цитологическое исследование, перенести шприц в пробирку и аккуратно ополоснуть иглу и смыть ее содержимое в пробирку, избегая образования пузырей. Пунктировать до помутнения среды.

 Условные сокращения

	пробирка с КЗЭДТА
	активатор свертывания с разделительным гелем

	стекла
	перемешать